

Rudbeckia Goldblitz

(Rudbeckia fulgida var. sullivantii)

Многолетние растения (обновлено 14.10.25)

Общая информация

| Расположение | Период цветения           | Высота                  | Ширина                  | Расстояние между растениями |
|--------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Солнечное    | Лето, Позднее лето, Осень | 24-28 в .<br>(61-71 cm) | 14-18 в .<br>(36-46 cm) | 14-18 в .<br>(36-46 cm)     |

Прорастание

| Форма семян | Рекомендуемый размер посевной кассеты | Семян в ячейке | До пикировки (недель) | дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания | pH/EC (1:2) субстрат для посева | Присыпание семян |
|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| PRM         | 288<br>72                             | 1<br>2-3       | 6-8<br>12-14          | 2-4                                                           | 5,8-6,5 pH<br>0,75 mmhos/cm     | Слегка присыпать |

Производство сеянцев

|              | Стадия 1                         | Стадия 2                                      | Стадия 3                                      | Стадия 4                                      |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Увлажнение   | Уровень 5-4                      | Уровень 4                                     | Уровень 3-4                                   | Уровень 3                                     |
| Температура  | 72-77°F<br>(22-25°C)             | 68-74°F<br>(20-23°C)                          | 65-70°F<br>(18-21°C)                          | 60-65°F<br>(16-18°C)                          |
| Освещенность | Опционально                      | 2 000-2 500 фут-свечей<br>(21 500-26 900 Lux) | 2 000-2 500 фут-свечей<br>(21 500-26 900 Lux) | 2 500-3 500 фут-свечей<br>(26 900-37 700 Lux) |
| Подкормки    | Менее 100ppm N<br>(Менее 0.7 EC) | от 100 до 175 ppm N<br>(от 0.7 до 1.2 EC)     | от 175 до 225 ppm N<br>(от 1.2 до 1.5 EC)     | от 175 до 225 ppm N<br>(от 1.2 до 1.5 EC)     |

Охлаждение

Нет

Ключевые моменты выращивания

Goldblitz HE нуждается НИ в обработке SD сеянца, НИ в вернализации для программы летних продаж. Для ускорения роста: См. Руководство по выгонке многолетних растений.

Выращивание до получения готового растения

| Выращивание при температуре                          | pH/EC (1:2) субстрат для выращивания | Подкормки                                 | Длина дня              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| (день) 65-68°F (18-20°C)<br>(ночь) 60-65°F (16-18°C) | 5,8-6,5 pH<br>1,2-1,5 mmhos/cm       | от 175 до 225 ppm N<br>(от 1.2 до 1.5 EC) | Требуется длинный день |

Расчет длины дня

Критическая долгота дня 14,5 часов.

Расчет выхода готовой продукции

| Тип продукции | Размер посадочной емкости | Сеянцев/горшок | Период выращивания | Сезон                                              | Регуляторы роста                    |
|---------------|---------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Однолетник    | 4"/4,5"/Quart             | 1 (ppp)        | 14-22 (неделя)     | Лето, СДТ(средняя дневная температура) 65°F (18°C) | даминозид 5 000 ppm<br>Опрыскивание |
| Однолетник    | 5"/6"/1 Gallon            | 1 (ppp)        | 14-23 (неделя)     | Лето, СДТ(средняя дневная температура) 65°F (18°C) | даминозид 5 000 ppm<br>Опрыскивание |

## Применение удобрений

Обеспечьте достаточную доступность Са (кальций) во время активного роста, чтобы избежать ожогов кончиков листа из-за дефицита кальция. Также обеспечьте активный климат, который способствует транспортировке питательных веществ в растении.

## Увеличение ветвления до формирования цветов

Для ежегодного окончания цикла производства не требуются сеянцы короткого дня, но их можно использовать.

## Дополнительная информация

При посеве не позднее 16-й недели растения будут готовы в то же время, что и многолетники первого года цветения. Создавать условия короткого дня (как для Goldsturm) для сеянцев не требуется. Для регуляторов роста: используйте даминозид 3 раза по 5000 ppm в виде спрея в качестве опции для более контролируемого роста. Смесь даминозида и хлормекват хлорида (3 раза даминозид 2500 ppm/хлормекват хлорид 750 ppm для опрыскивания) может быть дополнительным средством обработки. Не рекомендуется использовать спрей с уконазолом или паклобутразолом, так как они уменьшают размер листьев и растения выглядят тощими. Это растение требует относительно высокого уровня питания, поэтому не допускайте дефицита Mg, Ca и Fe. Высокий уровень освещения и хорошая вентиляция оказывают благоприятное воздействие. Возможные проблемы с листовой пластиной могут возникнуть на новых листьях (морщинистость, поднятие чашечки, краевой ожог кончиков) в период индукции цветения из-за более сложного доступа минералов на этой стадии развития. Не существует хорошей коррекции подкормок, можно только поддерживать как можно более низкую относительную влажность воздуха с оптимальной вентиляцией, чтобы обеспечить растениям оптимальный доступ элементов. Проблемы с листьями практически полностью исчезнут на стадии сбыта цветов. Для весенней и осенней выгонки: См. Руководство по выгонке многолетних растений.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

## Фотографии сорта



Goldblitz



Goldblitz



Goldblitz



Goldblitz



PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185  
+1 800-231-7065 [PanAmSeed.com](http://PanAmSeed.com)

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2026 Ball Horticultural Company