

Verbena Santos Purple

(Verbena rigida)

Многолетние растения (обновлено 31.10.23)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	Поздняя весна, Лето, Позднее лето, Осень	12 в . (30 cm)	48 в . (122 cm)	16 в . (41 cm)

Проращивание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от проращивания 50% сеянцев, до максимального проращивания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
PRM	288 128*	4 4	6-7 8	7-10	5,5-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Да

* Рекомендуемый размер посевной кассеты для выгонки

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3	Уровень 2	Уровень 2
Температура	68-72°F (20-22° C)	65-68°F (18-20°C)	60-65°F (16-18°C)	60-65°F (16-18°C)
Освещенность	Темный	2 000-2 500 фут-свечей (21 500-26 900 Lux)	2 000-2 500 фут-свечей (21 500-26 900 Lux)	4 000-5 000 фут-свечей (43 100-53 800 Lux)
Подкормки		от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)
Регуляторы роста		даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь/1,500/200-2,500/300 ppm/Опрыскивание		даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь/2,500/300-3,750/500 ppm/Опрыскивание

Охлаждение

Нет

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 65-68°F (18-20°C) (ночь) 60-65°F (16-18°C)	5,5-6,2 pH 1,3-1,5 mmhos/cm	от 175 до 225 ppm N (от 1.2 до 1.5 EC)	Факультативный длинный день

Расчет выхода готовой продукции


Тип продукции	Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
Однолетник	4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	11-14 (неделя)	Поздняя весна	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 2 000 -2 500 ppm Опрыскивание
Однолетник	4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	11-14 (неделя)	Поздняя весна	даминозид 2 000-2 500 ppm Опрыскивание
Однолетник	5"/6"/1 Gallon	3-4 (ppp)	10-13 (неделя)	Лето	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 2 000 -750 ppm Опрыскивание
Однолетник	5"/6"/1 Gallon	3-4 (ppp)	10-13 (неделя)	Лето	даминозид 2 000-2 500 ppm Опрыскивание
Однолетник	5"/6"/1 Gallon	3-4 (ppp)	11-14 (неделя)	Поздняя весна	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 2 000 -750 ppm Опрыскивание
Однолетник	5"/6"/1 Gallon	3-4 (ppp)	11-14 (неделя)	Поздняя весна	даминозид 2 000-2 500 ppm Опрыскивание

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта



Santos Purple



Santos Purple



Santos Purple



Santos Purple



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company