

Begonia Серии BabyWing® F1
(Begonia interspecific)

Однолетние растения (обновлено 16.10.25)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Тень, Солнечное	Ранняя весна, Весна, Поздняя весна, Лето, Позднее лето, Осень	12-15 в . (30-38 см)	10-12 в . (25-30 см)	10-12 в . (25-30 cm)

Прорастание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
PEL	288	1	7-8	7-10	5,8-6,2 pH 0,5 mmhos/cm	Нет

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 5	Уровень 4-5	Уровень 3-4	Уровень 3
Температура	72-77°F (22-25°C)	72-75°F (22-24°C)	72-75°F (22-24°C)	65-67°F (18-19°C)
Освещенность	Освещенность	1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux)	1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux)	2 500-5 000 фут-свечей (26 900-53 800 Lux)
Подкормки		Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)

Применение удобрений

Лучше всего проводить частые легкие подкормки. Используйте удобрение 20–10–20 в концентрации около 50 ppm на 8-й день и 100 ppm на 11-й день. Далее вносите удобрение через день до стадии 3. После появления настоящих листьев чередуйте с удобрением 15–0–15 до пересадки. После подкормки всегда промывайте листву.

Ключевые моменты выращивания

Поддерживайте высокую влажность до появления первого настоящего листа.

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 65-70°F (18-21°C) (ночь) 60-65°F (16-18°C)	6,0-6,5 pH 1,0-1,2 mmhos/cm	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	Нейтрально к длине дня

Расчет выхода готовой продукции

Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	6-8 (недель)	Весна	-
5"/6"/1 Gallon	1-2 (ppp)	6-8 (недель)	Весна	-
12" Pot or HB/5 Gallon	3-4 (ppp)	6-8 (недель)	Весна	-

Применение удобрений

Подкармливайте каждый второй полив удобрением 15-0-15 с содержанием азота от 150 ppm.

Чувствительность к химическому воздействию

BabyWing очень чувствителен к паклобутразолу и униконазолу. Избегайте попадания препарата на соседние растения. Использование хлормекват хлорида с целью контроля за ростом растений может вызвать фитотоксичность. Использование баковой смеси с даминозидом снизит фитотоксичность.

Распространенные проблемы


Насекомые вредители: Грибной комарик, Мухи - береговушки

Дополнительная информация


После пересадки, при необходимости, можно использовать очень легкое опрыскивание смесью Cusocel 300 ppm и B-Nine 2500 ppm.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.


Фотографии сорта




Bicolor




Pink




Red



Red Bronze
Leaf



White



White Bronze
Leaf



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company