

Begonia Серии Megawatt™ F₁

(Begonia interspecific)

Однолетние растения (обновлено 16.10.25)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Тень, Солнечное	Весна, Поздняя весна, Лето, Позднее лето, Осень	20-28 в . (51-71 cm)	16-24 в . (41-61 cm)	12-16 в . (30-41 cm)

Прорастание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания	pH/ЕС (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
PEL	288	1	7-8	7-21	5,8-6,2 pH 0,5 mmhos/cm	Нет

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 5	Уровень 4-5	Уровень 3-4	Уровень 3
Температура	72-77°F (22-25°C)	72-75°F (22-24°C)	72-75°F (22-24°C)	65-67°F (18-19°C)
Освещенность	Освещенность	6 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ 1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux)	6-8 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ 1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux)	6-8 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ 2 500-5 000 фут-свечей (26 900-53 800 Lux)
Подкормки		Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)

Ключевые моменты выращивания

Поддерживайте высокую влажность до появления первого настоящего листа.

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	pH/ЕС (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 65-70°F (18-21°C) (ночь) 60-65°F (16-18°C)	5,4-6,0 pH 1,0-1,2 mmhos/cm	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	Факультативный короткий день

Расчет выхода готовой продукции

Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	7-9 (неделя)	Поздняя весна	-
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	7-10 (неделя)	Лето	-
12" Pot or HB/5 Gallon	3 (ppp)	9-11 (неделя)	Лето	-

Чувствительность к химическому воздействию


Использование хлормекват хлорида с целью контроля за ростом растений может вызвать фитотоксичность. Использование баковой смеси с даминозидом снизит фитотоксичность.

Дополнительная информация


Все сорта Megawatt зацветают быстрее при продолжительности дня не более 12 часов. Большая продолжительность светового дня может задержать цветение на 4–7 дней для всех сортов Megawatt. При необходимости с целью регуляции размера растений Megawatt эффективно опрыскивать паклобутразолом в концентрации 2–5 ppm, в зависимости от условий окружающей среды, стадии роста растений и сортов. Повторная обработка - если потребуется.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.


Фотографии сорта



Pink Bronze
Leaf




Pink Green Leaf




Red Bronze
Leaf




Red Green Leaf



Rose Bronze
Leaf



Rose Green
Leaf



White Green
Leaf



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company