

Cuphea Pink Shimmer

(Cuphea ramosissima)

Однолетние растения (обновлено 16.10.25)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Полутень, Солнечное	Ранняя весна, Весна, Поздняя весна, Лето	10-16 в . (25-41 cm)	12-18 в . (30-46 cm)	8-12 в . (20-30 cm)

Прорастание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
PMPL	288		4	4-5	5,4-5,8 pH 1,5 mmhos/cm	Нет

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3-4	Уровень 2-4	Уровень 2-4
Температура	72-77°F (22-25°C)	72-77°F (22-25°C)	72-77°F (22-25°C)	72-77°F (22-25°C)
Освещенность	Освещенность	10-12 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ 1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux)	10-15 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ 1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux)	10-20 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ 2 500-5 000 фут-свечей (26 900-53 800 Lux)
Подкормки		Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)
Регуляторы роста	даминозид/2 500 ppm/Опрыскивание паклобутразол/1 ppm/Опрыскивание			

Ключевые моменты выращивания

Использовать регуляторы роста следует только на этапе 3. В теплых условиях используйте спрей с паклобутразолом 1 ppm. В более прохладных условиях используйте спрей с даминозидом 2500 ppm.

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 70-75°F (21-24°C) (ночь) 65-68°F (18-20°C)	5,8-6,5 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	от 175 до 225 ppm N (от 1.2 до 1.5 EC)	Нейтрально к длине дня

Расчет выхода готовой продукции

Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшok	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
Cell Pack	1 (ppp)	5-7 (неделя)	Весна	паклобутразол 2 ppm Опрыскивание
306 Pack	1 (ppp)	5-7 (неделя)	Весна	паклобутразол 2 ppm Опрыскивание
5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	6-8 (неделя)	Весна	-
10" Pot or HB/3 Gallon	3-4 (ppp)	9-10 (неделя)	Весна	-
12" Pot or HB/5 Gallon	4-5 (ppp)	10-11 (неделя)	Весна	-

Применение удобрений

Cuphea ramosissima реагирует на опрыскивание паклобутразолом 2 ppm и даминозидом 5000 ppm; после опрыскивания даминозидом растение начинает быстро расти. Опрыскивание паклобутразолом в низкой концентрации поможет сохранить декоративность растений на торговых площадках. Более крупные размеры приемлемы без PGR, если они перевозятся/продаются в срок. Паклобутразол, распыленный в небольшом количестве, продлевает жизнь растений, а также делает листву немного темнее и стебли крепче.

Чувствительность к химическому воздействию

Избегайте опрыскивания этефоном или смесью с этефоном, так как это может вызвать фитотоксичность.

Дополнительная информация

При пересадке обработайте растение фунгицидом. Используйте субстраты с отличной воздухопроницаемостью. Растения плохо растут на плотных почвах. Не переувлажняйте растения. Обеспечьте высокую освещенность, чтобы избежать вытягивания. Низкий уровень освещенности снижает разветвленность.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта



Pink Shimmer



Pink Shimmer



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company