

Celosia Серии Kosmo

(Celosia spicata)

Производство горшечных растений (обновлено 14.10.25)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	Поздняя весна, Лето, Позднее лето	8 в . (20 cm)	8-10 в . (20-25 cm)	8-10 в . (20-25 cm)

Прорастание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
COT	288	1	3-4	2-4	5,5-6,2 pH 0,7-1,2 mmhos/cm	Слегка присыпать

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 4	Уровень 3-4	Уровень 3-4
Температура	77°F (25°C)	72-77°F (22-25°C)	68-72°F (20-22°C)	68-72°F (20-22°C)
Освещенность	Освещенность	1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux)	1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux)	2 500-5 000 фут-свечей (26 900-53 800 Lux)
Подкормки		Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)

Ключевые моменты выращивания

Поддерживайте почву постоянно влажной, не допускайте пересыхания. Целозия формирует стержневой корень и чувствительна к повреждению корней.

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 65-68°F (18-20°C) (ночь) 62-65°F (17-18°C)	5,5-6,2 pH 1,0-1,5 mmhos/cm	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	Факультативный короткий день

Расчет длины дня

Будет цвести быстрее и равномернее при продолжительности светового дня 13 часов или менее.

Расчет выхода готовой продукции

Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	6-8 (недель)	Весна	-
4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	5-7 (недель)	Лето	-

Применение удобрений

Целозия чувствительна к высокому уровню солей.

Распространенные проблемы


Насекомые вредители: Тля, трипс, паутинный клещ, листовой минер
Болезни: Настоящая мучнистая роса, ботритис.

Дополнительная информация


Поддерживайте почву постоянно влажной и не допускайте пересыхания. Регуляторы роста не требуются. Но при необходимости можно использовать даминозид в концентрации от 2000 до 2500 ppm (2,4–3,0 г/л 85% препарата или 3,1–4,0 г/л 64% препарата) с 2–3 применениями. Не обрабатывайте, когда появляются цветочные почки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.


Фотографии сорта



Cherry



Orange



Purple Red



Salmon



Yellow



Mixture



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company