

Hibiscus Mahogany Splendor

(Hibiscus acetosella)

Однолетние растения (обновлено 15.02.23)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	-	36-60 в . (91-152 cm)	24-30 в . (61-76 cm)	24-36 в . (61-91 cm)

Проращивание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от проращивания 50% сеянцев, до максимального проращивания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
RAW	288	1	2-3	2-3	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Да

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3-4	Уровень 3-4	Уровень 3
Температура	71-76°F (22-24°C)	68-73°F (20-23°C)	68-73°F (20-23°C)	65-70°F (18-21°C)
Освещенность	Опционально	1 000-2 500 фут- свечей (10 800-26 900 Lux)	2 500-5 000 фут-свечей (26 900-53 800 Lux)	2 500-5 000 фут- свечей (26 900-53 800 Lux)
Подкормки		Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)
Регуляторы роста			даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь/2 500/300 ppm/Опрыскивание	

Ключевые моменты выращивания

Для проращивания свет необязателен.

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 65-70°F (18-21°C) (ночь) 62-67°F (17-19°C)	5,8-6,2 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	от 175 до 225 ppm N (от 1.2 до 1.5 EC)	-

Расчет выхода готовой продукции


Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшочек	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	5-6 (неделя)	Весна	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 2 500/300 ppm Опрыскивание
4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	5-6 (неделя)	Весна	паклобутразол 5-10 ppm Опрыскивание
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	6-8 (неделя)	Весна	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 2 500/300 ppm Опрыскивание
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	6-8 (неделя)	Весна	паклобутразол 5-10 ppm Опрыскивание
8"/2 Gallon	1 (ppp)	6-8 (неделя)	Весна	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 2 500/300 ppm Опрыскивание
8"/2 Gallon	1 (ppp)	6-8 (неделя)	Весна	паклобутразол 5-10 ppm Опрыскивание

Дополнительная информация


Мягкая прищипка способствует развитию разветвленности. Прищипку можно проводить примерно через 2 недели после пересадки, оставляя 4-5 узлов. Не прищипывайте слишком глубоко, так как это может привести к обнажению середины растения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.


Фотографии сорта




Mahogany
Splendor




Mahogany
Splendor



Mahogany
Splendor




Mahogany
Splendor



Mahogany
Splendor



Mahogany
Splendor



Mahogany
Splendor



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company