

Marigold (French) Flamenco

(Tagetes patula)

Однолетние растения (обновлено 16.10.25)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	Весна, Поздняя весна, Лето, Позднее лето	10-12 в . (25-30 cm)	6-8 в . (15-20 cm)	6-10 в . (15-25 cm)

Проращивание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от проращивания 50% сеянцев, до максимального проращивания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
COT, DTL	288	1	3-4	2-3	6,2-6,5 pH 0,75 mmhos/cm	Да

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3-4	Уровень 3	Уровень 3
Температура	70-72°F (21-22°C)	68-72°F (20-22°C)	68-75°F (20-24°C)	68-75°F (20-24°C)
Освещенность	Опционально			
Подкормки		Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)

Применение удобрений

Используйте удобрения на основе нитратов с низким содержанием фосфора.

Ключевые моменты выращивания

Для предотвращения токсичности железа поддерживайте pH почвы в пределах 6,2-6,5.

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 65-68°F (18-20°C) (ночь) 60-62°F (16-17°C)	6,2-6,5 pH 1,0-1,5 mmhos/cm	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	Факультативный короткий день

Расчет выхода готовой продукции

Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
306 Pack	1 (ppp)	3-4 (неделя)	Весна	-
4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	4-5 (неделя)	Весна	-
10" Pot or HB/3 Gallon	5-6 (ppp)	4-6 (неделя)	Весна	-

Применение удобрений

Начиная с 1 недели после пересадки, вносите удобрения из расчета 100–175 ppm N и 0,7–1,2 мС/см, используя преимущественно нитратные удобрения с низким содержанием фосфора. Поддерживайте ЕС среды на уровне 1,0-1,5 мС/см и pH на уровне 6,2-6,5. Для постоянной программы удобрений можно вносить удобрения из расчета 75–100 ppm N 0,5–0,7 мС/см, поддерживая при этом рекомендуемые вышеуказанные диапазоны ЕС и pH.

Распространенные проблемы

Насекомые вредители: Тля, паутинный клещ, белокрылка Болезни: Гниль на стадии прорастания

Дополнительная информация

Для предотвращения токсичности железа поддерживайте pH почвы в пределах 6,2-6,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта



Flamenco



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company