

Bellis Серии Bellissima™

(Bellis perennis)

Многолетние растения (обновлено 14.10.25)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Полутень	Ранняя весна, Весна, Поздняя весна	6-10 в . (15-25 cm)	5-8 в . (13-20 cm)	5-10 в . (13-25 cm)

Прорастание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания	pH/ЕС (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
PEL	512	1-2	5-6	3-5	5,5-6,2 pH 0,5-0,75 mmhos/cm	Да

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3	Уровень 2-3	Уровень 2
Температура	65-72°F (18-22°C)	65-68°F (18-20°C)	60-65°F (16-18°C)	60-65°F (16-18°C)
Освещенность	Опционально	6-8 mol·m ⁻² ·d ⁻¹	6-8 mol·m ⁻² ·d ⁻¹	6-8 mol·m ⁻² ·d ⁻¹
Подкормки		Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)

Охлаждение

Нет

Ключевые моменты выращивания

Используйте средний слой крупного вермикулита для улучшения однородности всходов.

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	pH/ЕС (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 60-65°F (16-18°C) (ночь) 40-45°F (4-7°C)	5,5-6,4 pH 1,1-1,3 mmhos/cm	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	Нейтрально к длине дня

Расчет выхода готовой продукции

Тип продукции	Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
Однолетник	306 Pack	1 (ppp)	6-8 (недель)	Осень	даминозид 1 000-2 000 ppm Опрыскивание
Однолетник	306 Pack	1 (ppp)	6-8 (недель)	Зима	даминозид 1 000-2 000 ppm Опрыскивание
Зимовка	5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	16-24 (недель)	Ранняя весна	даминозид 1 000-2 000 ppm Опрыскивание

Применение удобрений

Удобрять умеренно каждые 2 недели или по мере необходимости 100–150 ppm N с помощью полноценного сбалансированного удобрения. Поддерживайте ЕС среды на уровне 1,1-1,3 ЕС и pH на уровне 5,5-6,4.

Чувствительность к химическому воздействию

Повреждение листьев из-за высокой концентрации Tilt (пропиконазол); соблюдайте стандартную концентрацию и при необходимости опрыскивайте чаще.

Распространенные проблемы

Слишком глубокая посадка сеянцев может привести к гниению корневой шейки и появлению грибковых заболеваний. Избегайте скопления воды. Следите за появлением ржавчины, фомоза и тли.

Дополнительная информация

Выращивайте в максимально прохладных условиях, но избегайте температур ниже нуля. Для форсирования роста при выращивании при таких температурах, выращивайте при температуре от 55 до 58 °F (от 10 до 12 °C) в течение 4 недель перед продажей. PGR для ЕС – тилт (пропиконазол) в концентрации от 200 до 300 ppm.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта



Red



Rose



White



Mixture



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company