

Begonia (Spreading) Серии Hula™ F₁

(Begonia interspecific)

Однолетние растения (обновлено 12.12.24)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Тень, Солнечное	Ранняя весна, Весна, Поздняя весна, Лето, Позднее лето, Осень	6-10 в . (15-25 cm)	20-27 в . (51-69 cm)	12-20 в . (30-51 cm)

Прорастание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
PEL	288	1	7-8	7-10	5,8-6,2 pH 0,5 mmhos/cm	Нет

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 5	Уровень 4-5	Уровень 3-4	Уровень 3
Температура	72-77°F (22-25°C)	72-75°F (22-24°C)	72-75°F (22-24°C)	65-67°F (18-19°C)
Освещенность	Освещенность	1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux)	1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux)	2 500-5 000 фут-свечей (26 900-53 800 Lux)
Подкормки		Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)

Ключевые моменты выращивания

Поддерживайте высокую влажность до появления первого настоящего листа.

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 65-70°F (18-21°C) (ночь) 60-65°F (16-18°C)	6,0-6,5 pH 1,0-1,2 mmhos/cm		Нейтрально к длине дня

Расчет выхода готовой продукции

Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
306 Pack	1 (ppp)	6-8 (неделя)	Весна	-
4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	6-8 (неделя)	Весна	-
5"/6"/1 Gallon	1-2 (ppp)	6-8 (неделя)	Весна	-
12" Pot or HB/5 Gallon	3-4 (ppp)	8-10 (неделя)	Весна	-

Дополнительная информация

Производители могут использовать регуляторы роста при выращивании бегонии Hula только в случае необходимости. Бегония Hula хорошо реагирует на баковую смесь даминоцида (B-Nine/Alar) и хлормекватхлорида (CCC). Даминоцид (B-Nine/Alar) 2500 ppm. Хлормекватхлорид (CCC) 150 ppm и 300 ppm. Паклобутразол (Bonzi) также работает, но его следует использовать с осторожностью, так как он может вызвать серьезную задержку роста растений. При средней дневной температуре ниже или около 68°F/20°C рекомендуется опрыскивание паклобутразолом 2-3 ppm.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта



Bicolor Red
White



Blush



Pink



Red



White



Red and White
Mixture



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company