

Snapdragon Серии Snapshot™ F1

(Antirrhinum majus nanum)

Однолетние растения (обновлено 16.10.25)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	Ранняя весна, Весна, Осень	8-10 в . (20-25 cm)	10-12 в . (25-30 cm)	6-8 в . (15-20 cm)

Прорастание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
RAW	288	1	5-6	4-6	5,5-5,8 pH 0,75 mmhos/cm	Слегка присыпать

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3-4	Уровень 3-4	Уровень 3
Температура	64-68°F (18-20°C)	65-70°F (18-21°C)	62-65°F (17-18°C)	60-62°F (16-17°C)
Освещенность	Опционально	450-1 500 фут-свечей (4 800-16 100 Lux)	1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux)	2 500-5 000 фут-свечей (26 900-53 800 Lux)
Подкормки		Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)
Регуляторы роста	анцимидол/10 ppm/Опрыскивание			анцимидол/10 ppm/Опрыскивание

Ключевые моменты выращивания

Регуляторы роста: По возможности используйте DIF. Анкимдол, распыляемый через 3 и 4 недели после посева в концентрации 10 ppm, эффективен для контроля высоты.

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 55-70°F (13-21°C) (ночь) 45-55°F (7-13°C)	5,5-6,2 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	Факультативный длинный день

Расчет выхода готовой продукции

Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
Cell Pack	1 (ppp)	6 (неделя)	Ранняя весна	-
4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	6 (неделя)	Ранняя весна	-

Распространенные проблемы


Насекомые вредители: Трипс, тля
Болезни: Ложная мучнистая роса, ботритис, настоящая мучнистая роса

Дополнительная информация


При пересадке обработайте растение фунгицидом. Контроль высоты: Как только корни растения достигнут стенок горшка, можно немного подсушить перед поливом. Откажитесь от удобрений, особенно фосфорных и азотных на основе аммония. Львиный зев реагирует на разницу дневной и ночной температур (DIF) и при отрицательной DIF становится короче. При выращивании в соответствии с рекомендациями при низких температурах и высокой освещенности регуляторы роста не требуются. B-Nine, Bonzi и Sumagic эффективны для контроля высоты львиного зева, но могут задержать цветение и привести к менее равномерному сроку цветения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта




Burgundy




Burgundy
Bicolor




Coral Bicolor




Orange




Pink




Purple




Red




Red Bicolor



Rose



White



Yellow



Mixture



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company