

Portulaca Серии Happy Hour™ F₁

(Portulaca grandiflora)

Однолетние растения (обновлено 18.10.24)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	Поздняя весна, Лето	8-10 в . (20-25 cm)	10-12 в . (25-30 cm)	10-14 в . (25-36 cm)

Проращивание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от проращивания 50% сеянцев, до максимального проращивания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
MPL, RAW	288	1 4-6	4-5	2-3	5,5-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Нет

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3	Уровень 2-4	Уровень 2-4
Температура	71-79°F (22-26°C)	71-73°F (22-23°C)	68-73°F (20-23°C)	65-67°F (18-19°C)
Освещенность	Освещенность	2 500 фут-свечей (26 900 Lux)	2 500 фут-свечей (26 900 Lux)	5 000 фут-свечей (53 800 Lux)
Подкормки		Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)

Ключевые моменты выращивания

Для предотвращения образования розеток высевайте семена, когда естественная продолжительность светового дня превышает 10 часов 30 минут. При посеве ранее рекомендуемого срока обеспечьте условия длинного светового дня (увеличение продолжительности до 12–13 часов) на всех этапах производства до достижения критической естественной продолжительности светового дня.

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 68-76°F (20-24°C) (ночь) 65-67°F (18-19°C)	5,5-6,2 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	Нейтрально к длине дня

Расчет длины дня

При пересадке сеянцев при продолжительности светового дня менее 10 часов 30 минут, обеспечьте условия длинного дня.

Расчет выхода готовой продукции

Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
Cell Pack	36 (ppp)	5 (неделя)	Весна	-
4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	5-6 (неделя)	Весна	-

Применение удобрений

Подкармливайте каждый второй полив удобрением 15-0-15 с содержанием азота от 150 до 200 ppm.

Распространенные проблемы

Насекомые вредители: Паутинный клещ, трипс Болезни: Ризоктониоз, питиум

Дополнительная информация

Регуляторы роста, как правило, не требуются за исключением роста в условиях очень высоких температур. Высоту растения можно контролировать, позволяя почве как следует просыхать между поливами. Растениям можно дать слегка завянуть, когда корни достигнут края контейнера. Высоту растения также можно контролировать путем отказа от удобрений, особенно фосфора и аммонийных форм азота.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.


Фотографии сорта




Banana



Coconut



Deep Red



Fuchsia




Lemon



Orange



Peppermint



Rosita



Mixture



Pink Passion
Mixture



Tropical
Mixture



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company