

Matricaria Серии Vegmo

(Tanacetum parthenium)

Срезочные культуры (обновлено 16.10.25)

Общая информация

Тип производства	Использование	Длина стебля	Группа по срокам цветения
Теплица, Пленочная теплица с открытыми торцами	Аранжировочная зелень	28-36 в . (71-91 cm)	N/A

Прорастание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
PEL	288	1	4-5	3-5	5,6-5,9 pH 0,5 mmhos/cm	Нет

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 5	Уровень 3-4	Уровень 2-3	Уровень 2-3
Температура	64-68°F (18-20°C)	64-68°F (18-20°C)	64-68°F (18-20°C)	60-65°F (16-18°C)
Освещенность	Опционально	1 500-2 500 фут-свечей (16 100-26 900 Lux)	1 500-2 500 фут-свечей (16 100-26 900 Lux)	2 500-5 000 фут-свечей (26 900-53 800 Lux)
Подкормки	Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)

Выращивание до получения готового растения

pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
6,0-6,5 pH 0,2-0,6 mmhos/cm	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	Требуется длинный день

Расчет длины дня

Для цветения матрикарии необходим длинный световой день. Критическая долгота дня 14 часов. При удлинении продолжительности дня эффективно прерывание ночного периода на 2-4 часа, начинающееся в 12:00 ночи, или удлинение раннего утра до рассвета. Также можно использовать циклическое освещение по 7,5 минут каждые полчаса.

Расчет выхода готовой продукции

Тип производства	Использование сетки	Температура	Плотность посадки	Период выращивания
Теплица	Рекомендуется	16-18°C/60-65°F (day) 13-16°C/55-60°F (night)	7-8 растений/фут² (75-86 растений/м²)	10-12 недель
Теплица	Рекомендуется	13-14°C/55-58°F (day) 10-11°C/50-51°F (night)	7 растений/фут² (75 растений/м²)	14-16 недель
Теплица	Рекомендуется	22-24°C/72-76°F (day) 16-23°C/60-74°F (night)	8 растений/фут² (86 растений/м²)	7-10 недель

Применение удобрений

Уровень ЕС почвы во время выращивания культур должен поддерживаться на уровне от 0,2 до 0,6. При удобрении через систему орошения поддерживайте уровень ЕС от 0,8 до 1,2. Очень высокие уровни ЕС способствуют неравномерному росту растений. Используйте нитрат калия во время образования бутонов. Матрикария чувствительна к высокому содержанию солей.

Распространенные проблемы

Насекомые вредители: тля, листовой минер, Личинки бабочек, Трипс. Болезни: Серая гниль, питиум, ризоктониоз, белая гниль, тосповирусы. Прочее: Образование розеток из-за недостаточной продолжительности светового дня, отмирание верхушек или ожог листьев из-за ненадлежащего контроля температуры.

Дополнительная информация

На длину стебля влияют продолжительность светового дня, температура и продуктивность. Высокие температуры в период индукции приведут к укорочению стеблей. Матрикария не чувствительна к этилену.

Срезка

Собирайте растения при открытии 65-75% соцветий.

После срезки

Для наилучшего качества используйте цветочный раствор.

Вазостойкость

Срок сохранения срезанных цветов в вазе в среднем 11 дней.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.


Фотографии сорта



Single



Snowball Extra



Sunny Ball



Yellow



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company