

(*Zinnia marylandica*)

Однолетние растения (обновлено 03.10.24)

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	Весна, Поздняя весна, Лето	12-18 в . (30-46 cm)	12-18 в . (30-46 cm)	8-10 в . (20-25 cm)

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания	pH/ЕС (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
COT, RAW	288	1	3	2-3	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Слегка присыпать

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3-4	Уровень 3-4	Уровень 3
Температура	68-73°F (20-23°C)	70-75°F (21-24°C)	70-75°F (21-24°C)	65-70°F (18-21°C)
Освещенность	Опционально	1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux)	1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux)	2 500-5 000 фут-свечей (26 900-53 800 Lux)
Подкормки		Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)

Регуляторы роста	даминозид/1 250-2 500 ppm/Опрыскивание
------------------	--

Избегайте чрезмерной влаги на растениях и соцветиях. Мониторинг ботритиса.

Выращивание при температуре	pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 65-70°F (18-21°C)	5,5-6,2 pH	от 175 до 225 ppm N	Факультативный короткий день
(ночь) 60-65°F (16-18°C)	1,2-1,5 mmhos/cm	(от 1.2 до 1.5 EC)	

Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	8-9 (недель)	Весна	даминозид 3 500 ppm Опрыскивание
5"/6"/1 Gallon	3 (ppp)	8-9 (недель)	Весна	даминозид 3 500 ppm Опрыскивание
4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	5-6 (недель)	Лето	даминозид 3 500 ppm Опрыскивание
5"/6"/1 Gallon	3 (ppp)	5-6 (недель)	Лето	даминозид 3 500 ppm Опрыскивание

Насекомые вредители: Мониторинг тли в начале выращивания и трипсов в период цветения. Болезни: Избегайте высокой влажности и конденсата в теплице, так как эти условия благоприятны для развития ботритиса.

Дополнительная информация

Избегайте чрезмерной влаги на растениях и соцветиях. Мониторинг ботритиса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта



Cherry



Fire



Raspberry



Red



Starlight Rose



Sunburst



White



Yellow



Bonfire Mixture



Mixture



Raspberry
Lemonade
Mixture



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company