

Leucanthemum White Lion F₁

(Leucanthemum x superbum)

Многолетние растения (обновлено 14.10.25)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	Ранняя весна, Весна, Поздняя весна, Лето, Позднее лето	8-10 в . (20-25 cm)	8-12 в . (20-30 cm)	12 в . (30 cm)

Проращивание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от проращивания 50% сеянцев, до максимального проращивания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
RAW	288 72	1 4	6-7 7-8	4-10	5,5-6,2 pH 0,2-0,5 mmhos/cm	Опционально

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3-4	Уровень 2-3	Уровень 2-3
Температура	68-77°F (20-25°C)	65-68°F (18-20°C)	65-68°F (18-20°C)	60-65°F (16-18°C)
Освещенность	Опционально	3 000-5 000 фут-свечей (32 300-53 800 Lux)	5 000-7 000 фут-свечей (53 800-75 300 Lux)	5 000-7 000 фут-свечей (53 800-75 300 Lux)
Подкормки		Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)

Охлаждение

Нет

Молодые растения

Около 10 настоящих листьев.

Применение удобрений

Используйте сбалансированное удобрение на основе нитрата кальция. Не давайте подкормку непрерывно, чтобы избежать повышения уровня соли. Лучше периодически промывать свежей водой.

Ключевые моменты выращивания

Избегайте большого количества растворимых солей. Обеспечьте активный климат, включая движение воздуха и относительно высокий уровень освещенности. Не выращивайте слишком долго, так как старые сеянцы после пересадки растут неравномерно.

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 65-72°F (18-22°C) (ночь) 57-60°F (14-16°C)	5,5-6,2 pH 0,9-1,1 mmhos/cm	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	Факультативный длинный день

Расчет длины дня

Факультативное растение с длинного дня, но с очень низкой чувствительностью к длине дня, с критической длиной дня 10 часов. Чтобы завершить выращивание в начале весны, растениям требуется достаточная температура (среднесуточная температура 44–50 ° F), то есть южный зимний климат, чтобы расти и завершить рост в начале весны.

Расчет выхода готовой продукции

Тип продукции	Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
Зимовка	4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	18-19 (недель)	Ранняя весна, СДТ(средняя дневная температура) 65°F (18°C)	-
Однолетник	4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	9-10 (недель)	Весна, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	даминозид 2 500 ppm Опрыскивание
Зимовка	5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	18-19 (недель)	Ранняя весна, СДТ(средняя дневная температура) 65°F (18°C)	-
Однолетник	5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	10-11 (недель)	Весна, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	даминозид 2 500 ppm Опрыскивание

Применение удобрений

Используйте сбалансированное удобрение на основе нитрата кальция. Норма удобрения от 140 до 160 ppm. Избегайте непрерывной подкормки во избежание повышения уровней растворимых солей. Лучше периодически промывать свежей водой.

Чувствительность к химическому воздействию

Не используйте абамактин и не допускайте его попадания на кожу (даже в виде газа из соседнего помещения). Это погубит культуру.

Распространенные проблемы

Неравномерный рост может быть вызван использованием старых сеянцев или высоким содержанием солей.

Увеличение ветвления до формирования цветов


Выращивайте при рекомендуемой температуре. Производите для ранних весенних продаж, когда естественная продолжительность дня короткая. Чтобы завершить выращивание в начале весны, растениям требуется достаточная температура (среднесуточная температура 44–50 °F), то есть южный зимний климат, чтобы расти и завершить рост в начале весны. Для годового производства можно использовать конфигурацию с распылением 300 ppm на ранней стадии, чтобы стимулировать ветвление.

Дополнительная информация


Для 2-галлоновых горшков, используйте 3-4 сеянца на горшок. Чтобы завершить выращивание в начале весны, растениям требуется достаточная температура (среднесуточная температура 44–50 °F), то есть южный зимний климат, чтобы расти и завершить рост в начале весны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта



White Lion



White Lion



White Lion



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company