

Anemone Серии Mona Lisa® F1
(Anemone coronaria)

Срезочные культуры (обновлено 14.10.25)

Общая информация

Тип производства	Использование	Длина стебля	Группа по срокам цветения
Теплица, Пленочная теплица с открытыми торцами	Основа букета	18 в . (46 cm)	N/A

Проращивание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от проращивания 50% сеянцев, до максимального проращивания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
RAW	288	1	7-8	10-14	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Да

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4-5	Уровень 4-5	Уровень 4	Уровень 3-4
Температура	65-70°F (18-21°C)	65-70°F (18-21°C)	60-65°F (16-18°C)	60°F (16°C)
Освещенность		1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux)	1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux)	2 500-5 000 фут-свечей (26 900-53 800 Lux)
Подкормки		Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)

Применение удобрений

Начиная с этапа 2, начинайте удобрять рассаду два раза в неделю 50 ppm N из 14–0–14, чередуя с удобрением типа 20–10–20.

Ключевые моменты выращивания

Поскольку анемоны растут медленно, для получения здоровых сеянцев необходимо поддерживать надлежащие условия, такие как влажность, температура, удобрение и борьба с вредителями.

Выращивание до получения готового растения

pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
5,8-6,2 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	от 225 до 300 ppm N (от 1.5 до 2.0 EC)	Нейтрально к длине дня

Расчет выхода готовой продукции

Тип производства	Использование сетки	Температура	Плотность посадки	Период выращивания
Теплица	Не требуется	16-18°C/60-65°F (day) 13°C/55°F (night)	2-4 растений/фут² (22-43 растений/м²)	12-14 недель

Применение удобрений

Как только черенки укоренятся, вносите подкормку 200 ppm N из 15–5–15 Cal-Mag один раз в неделю. Альтернативно можно использовать удобрение на основе нитрата кальция в концентрации 200 ppm.

Распространенные проблемы

ПРИМЕЧАНИЕ: Анемоны образуют корни, которые по своей природе имеют темно-коричневый цвет. Учитывайте эту особенность при поиске симптомов корневой гнили. Насекомые вредители: Тля, Трипс, Белокрылка. Болезни: Ботритис, гниль кроны и корневая гниль являются распространенными заболеваниями анемонов.

Дополнительная информация

Оптимальная длина стебля может быть достигнута при прохладных условиях выращивания (от 53 до 58 °F/от 12 до 14 °C). Если при поддержании оптимальной температуры цветение слишком короткое, уменьшите интенсивность освещения.

Срезка

Сбор урожая производится, когда цветочные почки полностью окрашены и раскрыты примерно на 30–40 % (стадия чашечки). Избегайте сбора полностью раскрывшихся цветов с высыпанием пыльцы.

После срезки


Избегайте воздействия этилена, рекомендуется использовать средства, ингибирующие этилен. Увлажните и храните в холодильнике при температуре 1–3 °C (34–38 °F) в цветочном растворе при рекомендованной производителем норме.

Вазостойкость


5-7 дней

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.


Фотографии сорта




Deep Blue




Orchid Shade




Pink



Red Bicolor



Scarlet Eye



White



Wine White
Bicolor



Mixture



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company