

Perovskia Bluesette

(Perovskia atriplicifolia)

Многолетние растения (обновлено 14.10.25)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	Поздняя весна, Лето, Позднее лето, Осень	14-22 в . (36-56 cm)	14-24 в . (36-61 cm)	16-24 в . (41-61 cm)

Прорастание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
RAW	288 72*	1 3-4	5-6 7-8	2-7	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Слегка присыпать

* Рекомендуемый размер посевной кассеты для выгонки

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 4-3		
Температура	68-77°F (20-25°C)	68-73°F (20-23°C)	64-68°F (18-20°C)	60-65°F (16-18°C)
Освещенность	Освещенность	6-8 mol·m ⁻² ·d ⁻¹	6-8 mol·m ⁻² ·d ⁻¹	6-8 mol·m ⁻² ·d ⁻¹
Подкормки	Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 175 до 225 ppm N (от 1.2 до 1.5 EC)	от 175 до 225 ppm N (от 1.2 до 1.5 EC)

Охлаждение

Нет

Ключевые моменты выращивания

Для ускорения роста: См. Руководство по выгонке многолетних растений. Генетически компактный сорт требует активного климата. Не требуется применение регуляторов роста, за исключением неблагоприятных климатических условий, в которых можно использовать даминозид 1 раз в концентрации 1500 ppm. Прищипывание в целом не требуется, но допускается при выращивании в маленьких горшках, прищипывать до 3-4 узлов, примерно через 2-3 недели после пикировки. На стадии рассады сложно поддается прищипыванию. Опрыскивайте фунгицидом сразу после посева для предотвращения загнивания.

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 65-68°F (18-20°C) (ночь) 57-60°F (14-16°C)	5,8-6,2 pH 1,2-1,4 mmhos/cm	от 175 до 225 ppm N (от 1.2 до 1.5 EC)	Факультативный длинный день

Расчет длины дня

Накопитель света — более высокие уровни освещенности улучшают развитие и цветение.

Расчет выхода готовой продукции

Тип продукции	Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
Однолетник	4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	12-14 (недель)	Поздняя весна, СДТ(средняя дневная температура) 65°F (18°C)	-
Однолетник	4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	10-12 (недель)	Лето, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	-
Однолетник	5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	12-14 (недель)	Поздняя весна, СДТ(средняя дневная температура) 65°F (18°C)	-
Однолетник	5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	10-12 (недель)	Лето, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	-

Распространенные проблемы


Из-за неоптимальной подкормки листья становятся хлоротичными.

Дополнительная информация

Нуждается в активном климате для выращивания с максимально возможным уровнем освещенности. Оптимально более 15 моль на м2 в день. Может расти в условиях с меньшим уровнем освещения, но это задержит стадию прорастания. Не начинайте слишком рано при холодных ночах и пониженном уровне освещенности, что приведет к задержке развития. Почва должна иметь возможность высохнуть между поливами, избегайте избыточной влажности. Контролируйте ЕС в горшке во время активного роста, чтобы избежать пожелтения листьев. Один галлон — идеальный размер; используйте 1 мультитраже (от 3 до 4 семян) или 3 семечка в каждую из 288 ячеек кассеты, при этом не требуется прищипка или регуляторы роста. Для кассет с ячейками меньшего размера (чем 288) идет 1 семечко на ячейку. Прищипывание опционально (оставить 3-4 листовых узла), как и применение регулятора роста (1,500 ppm даминоцид). Прищипывание даст задержку готовности на 1-2 недели.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.


Фотографии сорта



Bluesette



Bluesette



Bluesette



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company