

Campanula Серии Campanella™ F₁

(Campanula medium)

Производство горшечных растений (обновлено 14.10.25)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	Ранняя весна, Весна, Поздняя весна, Лето, Позднее лето, Осень	8-10 в . (20-25 cm)	8-9 в . (20-23 cm)	10-12 в . (25-30 cm)

Прорастание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
PEL	288	1	6-7	5-10	5,8-6,2 pH 0,7-1,0 mmhos/cm	Нет

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4-5	Уровень 3-4	Уровень 3-4	Уровень 3
Температура	68-77°F (20-25°C)	65-75°F (18-24°C)	65-68°F (18-20°C)	60-64°F (16-18°C)
Освещенность				
Подкормки	Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)

Ключевые моменты выращивания

Предотвращайте появление гнили из-за использования фунгицидов. Критически важным для культуры Campanella является короткий световой день на стадии сеянцев. Применяйте короткий световой режим (менее 11 часов в сутки) через 2 недели после посева. Это предотвращает закладку бутонов на стадии сеянцев и обеспечивает правильный рост растений, что позволяет им хорошо заполнить горшки после пересадки. Оставьте короткие дни на оставшийся период выращивания сеянцев (4 недели короткого дня). После пересадки для начала цветения требуются длинные световые дни >14 часов. Campanella реагирует на даминозид в концентрации 2500 ppm или на смесь даминозида в концентрации 2500 ppm и хлормекват хлорида в концентрации 500 ppm.

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 62-64°F (17-18°C) (ночь) 58-60°F (14-16°C)	5,8-6,2 pH 1,0 mmhos/cm	от 175 до 225 ppm N (от 1.2 до 1.5 EC)	Требуется длинный день

Расчет длины дня

После пересадки поддерживайте длинный световой день >14 часов для начала цветения. Если требуются более сильные растения, двухнедельное воздействие короткого дня (<11 часов) перед воздействием длинного дня (>14 часов) приведет к получению более сильных растений.

Расчет выхода готовой продукции

Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	9-10 (неделя)	Весна	-
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	7-8 (неделя)	Лето	-

Дополнительная информация

Рекомендуемый размер горшка — 5 дюймов/13 см. Для завершения цикла выращивания важно создать условия длинного дня. Прищипывание не требуется. При использовании более крупных горшков (15 см или больше) легкое прищипывание может привести к развитию более наполненных и крупных растений.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.


Фотографии сорта



Blue



Lavender



Pink



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company