

Marigold (French) Fireball

(Tagetes patula)

Однолетние растения (обновлено 14.01.21)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	Ранняя весна, Весна, Поздняя весна, Лето, Позднее лето, Осень, Зима	10-12 в . (25-30 cm)	6-8 в . (15-20 cm)	6-10 в . (15-25 cm)

Проращивание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от проращивания 50% сеянцев, до максимального проращивания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
COT, DTL	288	1	3-4	2-3	6,2-6,5 pH 0,75 mmhos/cm	Да

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3-4	Уровень 3	Уровень 3
Температура	70-72°F (21-22°C)	68-72°F (20-22°C)	68-75°F (20-24°C)	68-75°F (20-24°C)
Освещенность	Опционально			
Подкормки		Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)

Ключевые моменты выращивания

Поддерживать pH почвы на уровне 6.2-6.5 для предотвращения токсического действия железа.

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 65-68°F (18-20°C) (ночь) 60-62°F (16-17°C)	6,2-6,5 pH 1,0-1,5 mmhos/cm	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	Факультативный короткий день

Расчет выхода готовой продукции

Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
306 Pack	1 (ppp)	3-4 (недель)	Весна	-
4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	4-5 (недель)	Весна	-
10" Pot or HB/3 Gallon	5-6 (ppp)	4-6 (недель)	Весна	-

Применение удобрений

Начать подкормки через неделю после пикировки, использовать преимущественно нитратные формы удобрений, с пониженным содержанием фосфора в концентрации 100- 175 ppm N 0.7 - 1.2 mS/cm). Поддерживать концентрацию ЕС в субстрате на уровне 1.0 - 1.5 mS/cm и pH 6.2 - 6.5. Для обеспечения указанных выше уровней питания, использовать удобрения в концентрации 75 - 100 ppm N 0.5 - 0.7 mS/cm).

Распространенные проблемы

Насекомые вредители: Тля, Клещ, Белокрылка
Болезни: Черная ножка на стадии сеянцев

Дополнительная информация

Поддерживать pH почвы на уровне 6.2-6.5 для предотвращения токсического действия железа. Максимальная контрастность окрасок цветка проявляется по мере его старения. Окраска цветка меняется от красной к оранжевой, а затем становится бронзовой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта



Fireball



Fireball



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company