

Gomphrena Серии QIS
(Gomphrena haageana)

Срезочные культуры (обновлено 17.01.25)

Общая информация

Тип производства	Использование	Длина стебля	Группа по срокам цветения
Пленочная теплица с открытыми торцами, Выращивание в открытом грунте	Аранжировочная зелень	24-26 в . (61-66 см)	N/A

Прорастание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
RAW	288	1	5-6	2-3	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Да

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3-4	Уровень 3-4	Уровень 3
Температура	68-72°F (20-22°C)	65-70°F (18-21°C)	65-70°F (18-21°C)	60-65°F (16-18°C)
Освещенность		1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux)	1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux)	2 500-5 000 фут-свечей (26 900-53 800 Lux)
Подкормки		Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)

Выращивание до получения готового растения

pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
5,8-6,2 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	от 225 до 300 ppm N (от 1.5 до 2.0 EC)	-

Расчет выхода готовой продукции

Тип производства	Использование сетки	Температура	Плотность посадки	Период выращивания
Выращивание в открытом грунте	Не требуется	18-24°C/65-75°F (day) 17-19°C/63-66°F (night)	1-2 растений/фут² (11-22 растений/м²)	10-12 недель

Дополнительная информация

Для повышения урожайности можно удалить первые соцветия растений, чтобы вторые соцветия развивались более интенсивно.

Срезка

Сбор проводить, когда цветы расцвели и головки стали округлыми, но до того, как они удлинятся.

После срезки


Качественная, чистая вода. Никаких дополнительных преимуществ от использования коммерческих цветочных растворов. Для обеспечения лучшего качества, если необходимо, хранить при температуре 3-4°C (36-41°F) менее 7 дней.

Вазостойкость

14-16 дней

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.


Фотографии сорта



Carmine



Orange



Red



Mixture



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company