

Leucanthemum Madonna F1

(Leucanthemum x superbum)

Многолетние растения (обновлено 14.10.25)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	Лето, Позднее лето, Осень	8-10 в . (20-25 cm)	8-12 в . (20-30 cm)	12 в . (30 cm)

Прорастание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
RAW	288 72	1 4	6-7 7-8	4-10	5,5-6,2 pH 0,2-0,5 mmhos/cm	Опционально

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3-4	Уровень 2-3	Уровень 2-3
Температура	68-77°F (20-25°C)	65-68°F (18-20°C)	65-68°F (18-20°C)	60-65°F (16-18°C)
Освещенность	Опционально	3 000-5 000 фут-свечей (32 300-53 800 Lux)	5 000-7 000 фут-свечей (53 800-75 300 Lux)	5 000-7 000 фут-свечей (53 800-75 300 Lux)
Подкормки		Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)

Охлаждение

Нет

Молодые растения

Требуется минимум 10 настоящих листьев перед выгонкой с помощью ночного перерыва (предпочтительный метод выгонки) или удлинения дня (мин. 16 ч.).

Применение удобрений

Используйте сбалансированное удобрение на основе нитрата кальция. Не давайте подкормку непрерывно, чтобы избежать повышения уровня соли. Лучше периодически промывать свежей водой.

Ключевые моменты выращивания

Избегайте большого количества растворимых солей. Обеспечьте активный климат, включая движение воздуха и относительно высокий уровень освещенности. Не выращивайте слишком долго, так как старые сеянцы после пересадки растут неравномерно.

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 65-72°F (18-22°C) (ночь) 57-60°F (14-16°C)	5,5-6,2 pH 0,9-1,1 mmhos/cm	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	Требуется длинный день

Расчет длины дня

Растению требуется как минимум 14,5 часов светового дня для начала цветения. Очень хорошо реагирует на ночные перерывы (4 часа между 22:00 и 2:00) при весенней выгонке. Развитие растения заканчивается с появлением 10 листьев.

Расчет выхода готовой продукции

Тип продукции	Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
Однолетник	4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	12-14 (неделя)	Поздняя весна, СДТ(средняя дневная температура) 65°F (18°C)	-
Однолетник	4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	12-13 (неделя)	Осень, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	даминозид 2 500-3 000 ppm Опрыскивание
Однолетник	4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	12-13 (неделя)	Осень, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	паклобутразол 20-30 ppm Опрыскивание
Однолетник	4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	11-12 (неделя)	Лето, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	паклобутразол 20-25 ppm Опрыскивание
Однолетник	4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	11-12 (неделя)	Лето, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	юниконазол 5 ppm Опрыскивание
Однолетник	4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	10-11 (неделя)	Лето, СДТ(средняя дневная температура) 78°F (26°C)	даминозид 5 000-6 000 ppm Опрыскивание
Однолетник	4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	11-12 (неделя)	Лето, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	даминозид 2 500-3 000 ppm Опрыскивание
Однолетник	4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	10-11 (неделя)	Лето, СДТ(средняя дневная температура) 74°F (23°C)	юниконазол 5-10 ppm Опрыскивание
Однолетник	4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	10-11 (неделя)	Лето, СДТ(средняя дневная температура) 78°F (26°C)	паклобутразол 20-30 ppm Опрыскивание
Однолетник	4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	10-11 (неделя)	Лето, СДТ(средняя дневная температура) 78°F (26°C)	юниконазол 10 ppm Опрыскивание
Однолетник	4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	11-12 (неделя)	Лето, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	-
Однолетник	5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	12-15 (неделя)	Поздняя весна, СДТ(средняя дневная температура) 65°F (18°C)	-
Однолетник	5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	11-12 (неделя)	Лето, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	-

Применение удобрений

Используйте сбалансированное удобрение на основе нитрата кальция. Норма удобрения от 140 до 160 ppm. Избегайте непрерывной подкормки во избежание повышения уровней растворимых солей. Лучше периодически промывать свежей водой.

Чувствительность к химическому воздействию

Не используйте абамектин и не допускайте его попадания на кожу (даже в виде газа из соседнего помещения). Это погубит культуру.

Распространенные проблемы

Неравномерный рост может быть вызван использованием старых сеянцев или высоким содержанием солей. Колебания в завершающей стадии цикла производства могут быть вызваны естественной продолжительностью светового дня, которая ниже критической, или отсутствием ночного перерыва.

Увеличение ветвления до формирования цветов

Соблюдайте рекомендуемые температуры, выращивайте при продолжительности светового дня не более 12 часов и следите за световым загрязнением из соседних районов.

Дополнительная информация

Для 2-галлоновых горшков, используйте 3-4 сеянца на горшок.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.


Фотографии сорта



Madonna



Madonna



Madonna



Madonna



Madonna



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company