

Zinnia Серии Double Zahara™

(Zinnia marylandica)

Однолетние растения (обновлено 03.10.24)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	Весна, Поздняя весна, Лето, Позднее лето, Осень	16-20 в . (41-51 cm)	16-20 в . (41-51 cm)	8-10 в . (20-25 cm)

Прорастание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
COT, RAW	288	1	3	2-3	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Да

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3-4	Уровень 3-4	Уровень 3
Температура	68-73°F (20-23°C)	68-76°F (20-24°C)	68-76°F (20-24°C)	65-70°F (18-21°C)
Освещенность	Опционально	1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux)	1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux)	2 500-5 000 фут-свечей (26 900-53 800 Lux)
Подкормки		Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)
Регуляторы роста	даминозид/1 250-2 500 ppm/Опрыскивание			

Ключевые моменты выращивания

Избегайте чрезмерной влаги на растениях и соцветиях. Мониторинг ботритиса.

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 65-70°F (18-21°C) (ночь) 59-64°F (15-18°C)	5,5-6,0 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	от 175 до 225 ppm N (от 1.2 до 1.5 EC)	Факультативный короткий день

Расчет выхода готовой продукции

Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	8-9 (недель)	Весна	даминозид 3 500-5 000 ppm Опрыскивание
5"/6"/1 Gallon	3 (ppp)	8-9 (недель)	Весна	даминозид 3 500-5 000 ppm Опрыскивание
4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	5-6 (недель)	Лето	даминозид 3 500-5 000 ppm Опрыскивание
5"/6"/1 Gallon	3 (ppp)	5-6 (недель)	Лето	даминозид 3 500-5 000 ppm Опрыскивание

Применение удобрений

Избегайте стресса, связанного с удобрениями/питанием, во время выращивания, так как это может привести к тому, что соцветия будут менее махровыми.

Распространенные проблемы

Насекомые вредители: Мониторинг тли в начале выращивания и трипсов в период цветения. Болезни: Избегайте высокой влажности и конденсата в теплице, так как эти условия благоприятны для развития ботритиса.

Дополнительная информация

При выращивании в условиях высокой освещенности соцветия будут более махровыми, более интенсивной окраски. Избегайте чрезмерной влаги на растениях и соцветиях. Мониторинг ботритиса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта




Bright Orange




Cherry




Fire




Raspberry
Ripple



Salmon



White



Yellow



Brilliant Mixture



Mixture



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company