

Begonia Серии Dragon Wing® F1
(Begonia interspecific)

Однолетние растения (обновлено 16.10.25)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Тень, Солнечное	Весна, Поздняя весна, Лето, Позднее лето, Осень	12-15 в . (30-38 cm)	15-18 в . (38-46 cm)	12-15 в . (30-38 cm)

Прорастание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
PEL	288	1	7-8	7-10	5,4-6,0 pH 0,5 mmhos/cm	Нет

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 5	Уровень 4-5	Уровень 3-4	Уровень 3
Температура	72-77°F (22-25°C)	72-75°F (22-24°C)	72-75°F (22-24°C)	65-67°F (18-19°C)
Освещенность	Освещенность	400-2 000 фут-свечей (4 300-21 500 Lux)	1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux)	2 500-5 000 фут-свечей (26 900-53 800 Lux)
Подкормки		Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)

Применение удобрений

Начните подкормку через 5 дней после извлечения из камеры проращивания или через 10 дней после прорастания на столах. Рекомендуемая дозировка составляет 50 ppm N, 2–3 раза в неделю. На третьей неделе увеличьте дозировку до 150–200 ppm N, 2–3 раза в неделю.

Ключевые моменты выращивания

Поддерживайте высокую влажность до появления первого настоящего листа.

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 65-70°F (18-21°C) (ночь) 60-65°F (16-18°C)	5,4-6,0 pH 1,0 mmhos/cm	от 175 до 225 ppm N (от 1.2 до 1.5 EC)	Факультативный короткий день

Расчет длины дня

Продленный день задержит начало цветения на 3–4 недели.

Расчет выхода готовой продукции

Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	7-9 (недель)	Поздняя весна	-
8"/2 Gallon	3 (ppp)	8-10 (недель)	Поздняя весна	-

Применение удобрений


Программа подкормки 200 ppm N один раз в неделю может быть начата, как только рассада начнет укореняться.

Дополнительная информация

Dragon Wing зацветет быстрее в условиях короткого дня. После пересадки, при необходимости, используйте Bonzi 3–5 ppm в виде спрея для контроля высоты. ПЕРЕСАДКА: Из-за направления роста стебля очень важно правильно расположить сеянцы Dragon Wing при размещении более одного сеянца в подвесных корзинах и контейнерах для доращивания. Сеянцы должны быть размещены так, чтобы растущий побег был обращен наружу, к внешней стороне контейнера. Направление роста остается неизменным по мере развития растения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта




Pink




Pink Bronze
Leaf




Red



Red Bronze
Leaf



White Bronze
Leaf



White Improved



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company