

Digitalis Серии Dalmatian F₁

(Digitalis purpurea)

Многолетние растения (обновлено 14.10.25)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	Поздняя весна, Лето	16-20 в . (41-51 cm)	12-14 в . (30-36 cm)	12 в . (30 cm)

Прорастание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания	pH/ЕС (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
PEL	288 128*	1 3	5-6 6-7	5-6	5,8-6,2 pH 0,7-1,0 mmhos/cm	Нет

* Рекомендуемый размер посевной кассеты для выгонки

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3	Уровень 3	Уровень 2
Температура	65-68°F (18-20°C)	65-68°F (18-20°C)	60-65°F (16-18°C)	60-65°F (16-18°C)
Освещенность	Освещенность	2 000-2 500 фут-свечей (21 500-26 900 Lux)	2 000-2 500 фут-свечей (21 500-26 900 Lux)	4 000-5 000 фут-свечей (43 100-53 800 Lux)
Подкормки		Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)
Регуляторы роста		даминозид/2 000 ppm/Опрыскивание паклобутразол/5 ppm/Опрыскивание юниконазол/3 ppm/Опрыскивание	даминозид/2 000 ppm/Опрыскивание паклобутразол/5 ppm/Опрыскивание юниконазол/3 ppm/Опрыскивание	даминозид/2 000 ppm/Опрыскивание паклобутразол/5 ppm/Опрыскивание юниконазол/3 ppm/Опрыскивание

Охлаждение

Нет

Ключевые моменты выращивания

Критическая долгота дня: 14 часов. Для форсирования роста необходим короткий день (10 часов). Для ускорения роста: См. Руководство по выгонке многолетних растений. Распыляйте фунгицид по влажной поверхности.

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	pH/ЕС (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 60-68°F (16-20°C) (ночь) 50-65°F (10-18°C)	5,8-6,2 pH 1,0-1,5 mmhos/cm	от 175 до 225 ppm N (от 1.2 до 1.5 EC)	Факультативный длинный день

Расчет длины дня

Долгота дня: 14 часов.

Расчет выхода готовой продукции

Тип продукции	Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшok	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
Выгонка	5"/6"/1 Gallon	1-2 (ppp)	12-13 (недель)	Поздняя весна, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	паклобутразол 2-3 ppm Смочить
Однолетник	5"/6"/1 Gallon	1-2 (ppp)	10-12 (недель)	Лето, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	юниконазол 5 ppm Опрыскивание
Однолетник	5"/6"/1 Gallon	1-2 (ppp)	10-12 (недель)	Лето, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	даминозид 2 500-3 500 ppm Опрыскивание
Выгонка	5"/6"/1 Gallon	1-2 (ppp)	12-13 (недель)	Поздняя весна, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	даминозид 2 500-3 500 ppm Опрыскивание
Выгонка	5"/6"/1 Gallon	1-2 (ppp)	12-13 (недель)	Поздняя весна, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	паклобутразол 5-10 ppm Опрыскивание
Выгонка	5"/6"/1 Gallon	1-2 (ppp)	12-13 (недель)	Поздняя весна, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	юниконазол 1 ppm Смочить
Однолетник	5"/6"/1 Gallon	1-2 (ppp)	10-12 (недель)	Лето, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	паклобутразол 5-10 ppm Опрыскивание
Выгонка	5"/6"/1 Gallon	1-2 (ppp)	12-13 (недель)	Поздняя весна, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	даминозид 2 500-3 500 ppm Опрыскивание
Однолетник	5"/6"/1 Gallon	1-2 (ppp)	10-12 (недель)	Лето, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	паклобутразол 2-3 ppm Смочить
Однолетник	8"/2 Gallon	3-4 (ppp)	10-12 (недель)	Лето	паклобутразол 5-10 ppm Опрыскивание
Однолетник	8"/2 Gallon	3-4 (ppp)	10-12 (недель)	Лето	юниконазол 5 ppm Опрыскивание
Однолетник	8"/2 Gallon	3-4 (ppp)	10-12 (недель)	Лето	даминозид 2 500-3 000 ppm Опрыскивание
Выгонка	8"/2 Gallon	3-4 (ppp)	12-13 (недель)	Поздняя весна, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	паклобутразол 5-10 ppm Опрыскивание
Выгонка	8"/2 Gallon	3-4 (ppp)	12-13 (недель)	Поздняя весна, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	юниконазол 5 ppm Опрыскивание
Выгонка	8"/2 Gallon	3-4 (ppp)	12-13 (недель)	Поздняя весна, СДТ(средняя дневная температура) 68°F (20°C)	даминозид 2 500-3 500 ppm Опрыскивание

Применение удобрений

Внесите комплексное удобрение из расчета 1/2 (75-100 ppm удобрения на основе нитратов с ЕС 0,7-1,2 mmhos/cm). Сохраняйте pH почвы в пределах 5,8-6,2. Уровень pH 7 или выше может вызвать пожелтение молодых листьев, низкий рост растений и стрессовое цветение.

Распространенные проблемы


Насекомые вредители: Тля, Трипс, Белокрылка
Болезни: Серая гниль, ложная мучнистая роса, листовая пятнистость

Дополнительная информация

Дигиталис можно выращивать при высокой освещенности, при условии наличия достаточной влаги. Контролируйте ЕС среды в генеративной фазе и поддерживайте ее на постоянном уровне. Избегайте пересыхания, так как это может привести к гибели цветков.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта




Crème




Peach



Purple



Rose



White



Mixture



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company