

Dianthus Серии Dash™ F₁

(Dianthus barbatus)

Однолетние растения (обновлено 19.08.24)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	Ранняя весна, Весна, Поздняя весна, Лето, Позднее лето, Осень, Зима	15-20 в . (38-51 см)	12-14 в . (30-36 см)	12-14 в . (30-36 см)

Прорастание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
PEL	288	1	5-6	3-4	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Да

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3-4	Уровень 2-3	Уровень 2-3
Температура	64-68°F (18-20°C)	65-70°F (18-21°C)	60-65°F (16-18°C)	55-60°F (13-16°C)
Освещенность	Опционально	5-8 mol·m ⁻² ·d ⁻¹	8-10 mol·m ⁻² ·d ⁻¹	10 mol·m ⁻² ·d ⁻¹
Подкормки		Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 175 до 225 ppm N (от 1.2 до 1.5 EC)
Регуляторы роста		паклобутразол/5 ppm/Опрыскивание	паклобутразол/5 ppm/Опрыскивание	

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 65-75°F (18-24°C) (ночь) 40°F (4°C)	5,8-6,2 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	от 175 до 225 ppm N (от 1.2 до 1.5 EC)	Факультативный длинный день

Расчет выхода готовой продукции

Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	9-10 (неделя)	Лето	паклобутразол 20 ppm Опрыскивание
5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	11-12 (неделя)	Осень	паклобутразол 20 ppm Опрыскивание

Применение удобрений

Начинайте вносить удобрения на основе нитратов из расчета 175-225 ppm с низким содержанием фосфора через неделю после пересадки один раз в неделю.

Чувствительность к химическому воздействию

Избегайте применения фунгицидов, содержащих действующее вещество азоксистробин, например, Heritage, так как это может вызвать фитотоксические симптомы у диантуса Дэш.

Распространенные проблемы

Насекомые вредители: Трипс, тля, клещ Болезни: Настоящая мучнистая роса.

Дополнительная информация

Диантус Дэш имеет естественный компактный габитус и хорошее базальное ветвление по сравнению с другими диантусами типа барбатус, что делает его более подходящим для выращивания в контейнерах. В течение первых 2 недель выращивания растений в теплице обеспечивайте дневную температуру 65-75°F (18-24°C) и ночную температуру 60°F (15°C) для хорошего укоренения. По окончании выращивания температура днем 60-70°F (15-21°C), ночью - около 50°F (11-12°C). Более низкие температуры допустимы по мере завершения развития растений.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта



Crimson



Magician



Pink



Violet



White



Mixture



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company