

Lisianthus Серии Can Can F₁

(Eustoma grandiflorum)

Срезочные культуры (обновлено 02.12.24)

Общая информация

Тип производства	Использование	Длина стебля	Группа по срокам цветения
Теплица, Пленочная теплица с открытыми торцами	Основа букета, Дополнительные элементы	36-45 в . (91-114 см)	2

Прорастание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от прорастания 50% семян, до максимального прорастания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
PEL	406	1	8-10	8-12	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Слегка присыпать

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3-4	Уровень 3-4	Уровень 3
Температура	68-72°F (20-22°C)	68-72°F (20-22°C)	65-68°F (18-20°C)	62-65°F (17-18°C)
Освещенность		1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux)	1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux)	2 500-5 000 фут-свечей (26 900-53 800 Lux)
Подкормки	Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 175 до 225 ppm N (от 1.2 до 1.5 EC)

Ключевые моменты выращивания

Избегать повышения температуры субстрата (>72°F/22°C) начиная со Стадии 2 , т.к. это может вызвать возникновение розеточности и замедлить рост сеянцев. Также очень важно создать систему профилактического контроля за болезнями и вредителями, при производстве лизиантуса.

Выращивание до получения готового растения

pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	Факультативный длинный день

Расчет длины дня

В зимний период, при продолжительности дня менее 12 часов, рекомендуется применение дополнительного освещения (газоразрядные или лампы накаливания). Длинный день (более 14 часов) или ночные перерывы с 10 вечера до 2 часов ночи ускорят цветение. Предпочтительнее использовать HID-свет, так как он повышает качество цветков и сокращает время сбора урожая.

Расчет выхода готовой продукции

Тип производства	Использование сетки	Температура	Плотность посадки	Период выращивания
Теплица	Рекомендуется	18-29°C/65-85°F (day) 13-18°C/55-65°F (night)	6-8 растений/фут² (65-86 растений/м²)	12-16 недель
Пленочная теплица с открытыми торцами	Рекомендуется	18-29°C/65-85°F (day) 13-18°C/55-65°F (night)	6-8 растений/фут² (65-86 растений/м²)	12-16 недель

Распространенные проблемы

Насекомые вредители: Тля, Листовой минер, Трипс, Белокрылка
Болезни: Серая гниль, Фузариоз, Питиум, Ризоктониоз, Тосповирусы
Прочие: водоросли на поверхности рассадной кассеты, розеточность

Дополнительная информация

Длина стебля срезочного лизиантуса, выращенного под прямым солнечным светом, короче чем у выращенного в теплице. Серия Cap Cap - это серия махрового лизиантуса F1 веерного типа. Растения цветут верхними цветами, производя больше соцветий на верхушке каждого стебля в течение короткого периода цветения, создавая эффект букета. Серия Cap Cap относится к группе скорости 3 (средняя/среднескоростная) по скорости цветения. Время сбора урожая зависит от времени года, температуры, длины дня и интенсивности света, а также от дополнительного освещения и условий в теплице.

Срезка

Собирайте, когда первый цветок полностью раскроется.

После срезки


Увлажните цветы раствором для цветочной гидратации в течение одного часа при комнатной температуре. Храните в холодильнике при температуре 2-5°C (36-41°F) в цветочном растворе при рекомендованной производителем норме.

Вазостойкость


10-14 дней

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта



Carmine Rose



Purple



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company