

Gazania Серии New Day® F1
(Gazania rigens)

Однолетние растения (обновлено 12.12.24)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	Поздняя весна, Лето	8-10 в . (20-25 cm)	6-8 в . (15-20 cm)	6-8 в . (15-20 cm)

Прорастание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
COT	288	1	4-5	3-4	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Да

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3-4	Уровень 2-3	Уровень 2-3
Температура	70-72°F (21-22°C)	68-72°F (20-22°C)	68-70°F (20-21°C)	65-68°F (18-20°C)
Освещенность	Опционально	1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux)	1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux)	2 500-5 000 фут-свечей (26 900-53 800 Lux)
Подкормки		Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)

Ключевые моменты выращивания

При производстве сеянцев газании, регуляторы роста не требуются. Избегать повышения концентрации солей/высокой Ec, в субстрате при выращивании сеянцев т.к. это может повлиять на появление краевого ожога листа и изменение формы.

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 65-70°F (18-21°C) (ночь) 55-60°F (13-16°C)	5,8-6,2 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	от 175 до 225 ppm N (от 1.2 до 1.5 EC)	Факультативный длинный день

Расчет выхода готовой продукции

Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
306 Pack	1 (ppp)	8-9 (неделя)	Поздняя весна	даминозид 3 000 ppm Опрыскивание
5"/6"/1 Gallon	3 (ppp)	8-9 (неделя)	Поздняя весна	даминозид 3 500 ppm Опрыскивание
306 Pack	1 (ppp)	7-8 (неделя)	Лето	даминозид 3 000 ppm Опрыскивание
5"/6"/1 Gallon	3 (ppp)	7-8 (неделя)	Лето	даминозид 3 500 ppm Опрыскивание

Распространенные проблемы

Насекомые вредители: Тля, Трипс, Клещ, Белокрылка
Болезни: Черная ножка на стадии сеянцев

Дополнительная информация


Период получения готовой продукции может зависеть от уровня освещенности, например: при выращивании в районах с низким уровнем освещенности или в период с низкой интенсивностью света, выход готовой продукции может задержаться примерно на 3 недели. Регуляторы роста: при необходимости, B-Nine/Alar (daminozide) 3,500 ppm (4.2 г/литр концентрация д.в. 85% или 5.6 г/литр концентрация д.в. 64%) через 2-3 недели после пикировки, однократно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта



Bronze Shades



Clear Orange



Pink Shades



Red Shades



Red Stripe



Rose Stripe



White



Yellow



Bright Mixture



Mixture



Tiger Mixture



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company