

Dahlia Серии Figaro™

(Dahlia x hybrida)

Однолетние растения (обновлено 16.10.25)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Полутень	Весна, Поздняя весна, Лето, Позднее лето, Осень	14-18 в . (36-46 cm)	10-12 в . (25-30 cm)	10-14 в . (25-36 cm)

Прорастание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
RAW	288	1	4-5	3-7	5,5-5,8 pH 0,5-0,75 mmhos/cm	Да

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 3	Уровень 3	Уровень 2-3	Уровень 2-3
Температура	68-73°F (20-23°C)	68-73°F (20-23°C)	65-70°F (18-21°C)	65-70°F (18-21°C)
Освещенность		1 500-3 000 фут-свечей (16 100-32 300 Lux)	1 500-3 000 фут-свечей (16 100-32 300 Lux)	2 500-4 000 фут-свечей (26 900-43 100 Lux)
Подкормки		Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)

Ключевые моменты выращивания

Если используется камера проращивания, при первых признаках прорастания перенесите лотки в теплицу.

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 52-60°F (11-16°C) (ночь) 52-60°F (11-16°C)	5,8-6,2 pH 0,75-1,0 mmhos/cm	от 225 до 300 ppm N (от 1.5 до 2.0 EC)	Требуется длинный день

Расчет длины дня

Идеальная продолжительность светового дня для далии Figaro составляет от 12 до 14 часов. Короткие дни приведут к образованию клубней. Слишком длинные дни (16 часов) заставляют растения оставаться в вегетативном состоянии и задерживают начало цветения.

Расчет выхода готовой продукции

Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшok	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
306 Pack	1 (ppp)	5-6 (неделя)	Весна	-
4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	5-6 (неделя)	Весна	-

Чувствительность к химическому воздействию

Для контроля за ростом растений можно использовать анкимдол, паклбутразол, даминозид и хлормекват хлорид.

Дополнительная информация

Очень хорошо реагирует на B-Nine/Alar. Также реагирует на разницу дневной и ночной температур (DIF), и растения становятся компактнее при отрицательной DIF.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта



Orange Shades



Red Shades



Violet Shades



White



Yellow Shades



Mixture



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company