

Coleus, Premium Shade Серии Kong®  
(Solenostemon scutellarioides)

Однолетние растения (обновлено 12.12.24)

Общая информация

| Расположение   | Период цветения | Высота                  | Ширина                  | Расстояние между растениями |
|----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Тень, Полутень | -               | 18-20 в .<br>(46-51 cm) | 15-18 в .<br>(38-46 cm) | 15-24 в .<br>(38-61 cm)     |

Прорастание

| Форма семян | Рекомендуемый размер посевной кассеты | Семян в ячейке | До пикировки (недель) | дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания | pH/EC (1:2) субстрат для посева | Присыпание семян |
|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| PEL         | 288                                   | 1              | 5-6                   | 4-5                                                           | 5,5-5,8 pH<br>0,75 mmhos/cm     | Слегка присыпать |

Производство сеянцев

|              | Стадия 1             | Стадия 2                         | Стадия 3                                  | Стадия 4                                      |
|--------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Увлажнение   | Уровень 4            | Уровень 3-4                      | Уровень 2-4                               | Уровень 2-4                                   |
| Температура  | 72-75°F<br>(22-24°C) | 72-75°F<br>(22-24°C)             | 68-70°F<br>(20-21°C)                      | 60-62°F<br>(16-17°C)                          |
| Освещенность | Опционально          | 2 500 фут-свечей<br>(26 900 Lux) | 2 500 фут-свечей<br>(26 900 Lux)          | 2 500-5 000 фут-свечей<br>(26 900-53 800 Lux) |
| Подкормки    |                      | Менее 100ppm N<br>(Менее 0.7 EC) | от 100 до 175 ppm N<br>(от 0.7 до 1.2 EC) | от 100 до 175 ppm N<br>(от 0.7 до 1.2 EC)     |

Применение удобрений

Для предотвращения развития болезней, поливать в первой половине дня, вечером листья растений должны быть сухими.

Ключевые моменты выращивания

Колеус очень чувствителен к высокому содержанию солей в почве, особенно к высокому содержанию солей аммония. На стадии прорастания необходимо поддерживать уровень аммония - менее 10ppm. Регуляторы роста, как правило, не требуются.

Выращивание до получения готового растения

| Выращивание при температуре                          | pH/EC (1:2) субстрат для выращивания | Подкормки                                 | Длина дня                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| (день) 68-75°F (20-24°C)<br>(ночь) 65-68°F (18-20°C) | 5,8-6,2 pH<br>1,5-2,0 mmhos/cm       | от 100 до 175 ppm N<br>(от 0.7 до 1.2 EC) | Факультативный короткий день |

Расчет выхода готовой продукции

| Размер посадочной емкости | Сеянцев/горшок | Период выращивания | Сезон | Регуляторы роста |
|---------------------------|----------------|--------------------|-------|------------------|
| 306 Pack                  | 1 (ppp)        | 4-5 (недель)       | Весна | -                |
| 4"/4,5"/Quart             | 1 (ppp)        | 4-5 (недель)       | Весна | -                |
| 5"/6"/1 Gallon            | 1 (ppp)        | 5-6 (недель)       | Весна | -                |

Распространенные проблемы

Насекомые вредители: Тля, Мучнистый червец, Белокрылка  
Болезни: Альтернариоз, Серая гниль, Вертициллез  
Прочие: Чрезмерное удлинение междоузлий при низком освещении.

## Дополнительная информация

Возможно применение Этефона для усиления ветвления и контроля высоты растений. Не прищипывать, после прищипки может уменьшиться размер листа и задержится выход готовой продукции. Регуляторы роста: серии Kong и Kong Jr. хорошо ветвятся и имеют короткие междоузлия, но из-за очень крупных листьев, растения требуют дополнительного пространства и расстановки до того, как они станут слишком высокими. Регуляторы роста, как правило не требуются. При необходимости, возможно применение B-Nine/Alar (daminozide) 2,500-5,000ppm (0.3-0.6 г/литр концентрация д.в. 85% или 4.0-8.0 г/литр концентрация д.в. 64%) через 2-3 недели после пикировки. Повторная обработка при необходимости.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

## Фотографии сорта

---



Lime Sprite



Mosaic




Red



Rose



Salmon Pink



Scarlet



Empire Mixture



PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185  
+1 800-231-7065 [PanAmSeed.com](http://PanAmSeed.com)

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2026 Ball Horticultural Company