

Myosotis Серии Mon Amie

(Myosotis sylvatica)

Многолетние растения (обновлено 14.10.25)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Полутень, Солнечное	Ранняя весна, Весна	8-10 в . (20-25 cm)	6-8 в . (15-20 cm)	6-8 в . (15-20 cm)

Прорастание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
RAW	288	1	4-5	3-5	5,6-5,8 pH 0,75 mmhos/cm	Нет

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3	Уровень 2	Уровень 2
Температура	68-74°F (20-23°C)	65-68°F (18-20°C)	60-65°F (16-18°C)	60-65°F (16-18°C)
Освещенность	Опционально	2 000-2 500 фут-свечей (21 500-26 900 Lux)	2 000-2 500 фут-свечей (21 500-26 900 Lux)	3 000-4 000 фут-свечей (32 300-43 100 Lux)
Подкормки		от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)

Охлаждение

Нет

Ключевые моменты выращивания

Поддерживайте низкий уровень pH, чтобы избежать хлороза.

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 60-70°F (16-21°C) (ночь) 50-55°F (10-13°C)	5,6-5,8 pH 1,3-1,5 mmhos/cm	от 175 до 225 ppm N (от 1.2 до 1.5 EC)	Нейтрально к длине дня

Расчет выхода готовой продукции

Тип продукции	Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
Зимовка	4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	16-22 (недель)	Ранняя весна	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 3 500 -750 ppm Опрыскивание
Однолетник	4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	7-9 (недель)	Весна	даминозид/хлормекат хлорид баковая смесь 3 500 -750 ppm Опрыскивание

Применение удобрений

Начиная через неделю после пересадки, вносите удобрения в дозировке 3 (175–225 ppm N; 1,2–1,5 mS/cm), используя преимущественно нитратные удобрения с низким содержанием фосфора. При необходимости чередуйте со сбалансированным удобрением на основе аммония и нитрата, чтобы стимулировать рост и сбалансировать pH субстрата. Поддерживайте ЕС среды на уровне 1,5-2,0 мС/см и pH на уровне 5,6-5,8. Избегайте высокого pH среды, так как это приведет к интервенозному хлорозу молодой листвы, вызванному дефицитом железа. Если pH среды превышает 6,0, примите корректирующие меры. Кроме того, может быть полезно дополнить программу подкормки хелатами железа.

Распространенные проблемы


Насекомые вредители: Тля

Дополнительная информация

Поддерживайте низкий уровень pH. *Myosotis* страдает от хлороза при высоком pH. Выращивать также, как *Primula acaulis*. См. GrowerFacts для получения подробной информации о том, как смягчить хлороз, вызванный высоким pH.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.


Фотографии сорта



Blue



Pink



Mixture



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company