

Snapdragon Серии Early Potomac™ F1

(Antirrhinum majus)

Срезочные культуры (обновлено 16.10.25)

Общая информация

Тип производства	Использование	Длина стебля	Группа по срокам цветения
Теплица, Пленочная теплица с открытыми торцами	Вертикальные формы	39-60 в . (99-152 cm)	3

Прорастание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от прорастания 50% сеянцев, до максимального прорастания	pH/ЕС (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
RAW	406	1	4-5	4-6	5,5-6,0 pH 0,75 mmhos/cm	Слегка присыпать

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3-4	Уровень 3-4	Уровень 3
Температура	65-70°F (18-21°C)	60-65°F (16-18°C)	60-65°F (16-18°C)	60°F (16°C)
Освещенность		1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux)	1 000-2 500 фут-свечей (10 800-26 900 Lux)	2 500-5 000 фут-свечей (26 900-53 800 Lux)
Подкормки		Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)

Применение удобрений

Серия Snapdragon чувствительна к высокому содержанию солей, особенно аммония.

Ключевые моменты выращивания

Избегайте высокого pH среды (>6,5), так как это может вызвать дефицит железа и бора. Отделение верхушки рассады может быть вызвано дефицитом бора, высоким уровнем ЕС и избыточным накоплением влаги на растущей верхушке, а также плохой циркуляцией воздуха. Включите в программу профилактическое применение фунгицида для мониторинга мучнистой росы.

Выращивание до получения готового растения

pH/ЕС (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
5,8-6,2 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	от 175 до 225 ppm N (от 1.2 до 1.5 EC)	-

Расчет выхода готовой продукции

Тип производства	Использование сетки	Температура	Плотность посадки	Период выращивания
Теплица	Требуется	21-29°C/70-85°F (day) 13-16°C/55-60°F (night)	10-12 растений/фут² (108-129 растений/м²)	10-14 недель
Пленочная теплица с открытыми торцами	Требуется	21-29°C/70-85°F (day) 13-16°C/55-60°F (night)	10-12 растений/фут² (108-129 растений/м²)	10-14 недель

Применение удобрений

Фосфор и кальций обычно вносятся в субстрат перед посадкой, а остальные питательные вещества поступают с растворимым удобрением во время роста. Суперфосфат, внесенный в количестве 5 фунтов/100 фут.² (2 грамма/м²), должен обеспечить достаточное количество фосфора. Если анализы почвы показывают низкий уровень кальция, добавьте известняк (если pH низкий) или гипс (если pH приемлемый), оба из расчета 5 фунтов/100 фут.² (250 грамм/м²). После пересадки оросите чистой водой. Начиная вносить удобрения со второго полива. Используйте удобрения с низким содержанием аммония - от 150 до 200 ppm. Используйте постоянное удобрение, время от времени выщелачивая чистую воду. Высокая влажность или уровень подкормок приведут к появлению чрезмерного количества боковых побегов.

Распространенные проблемы

Насекомые вредители: Тля, Трипс Болезни: Ложная мучнистая роса, ботритис, ржавчина, настоящая мучнистая роса Прочее: Высокий pH среды, дефицит железа или бора, чрезмерное количество боковых побегов

Дополнительная информация

Группа 3: ночь: 55 - 60°F (13 - 16°C), День: 60 - 65°F (16 - 18°C). 2,500 - 4,500 фут-свечей. Группа 4: Ночь: >60°F (>16°C), День: >65°F (>18°C). 3,000 - 5,000 фут-свечей. Две опорные сетки - это минимум, но три предпочтительнее. Размеры сетки от 4 x 4 дюйма (10 x 10 см) до 6 x 6 дюймов. (15 x 15 см) используются чаще всего. Разместите первый уровень на высоте 4-6 дюймов. (10 - 15 см) над уровнем почвы. Разместите второй уровень на высоте 6 дюймов. (15 см) над первым уровнем. Поднимайте верхний уровень опорных сеток по мере удлинения стеблей.

Срезка

Собирайте стебли, когда 5-6 соцветий раскрылись. После сбора урожая держите Snapdragons вертикально, чтобы предотвратить скручивание стеблей.

После срезки


Snapdragons очень чувствительны к этилену; рекомендуется обрабатывать препаратом, ингибирующим этилен. Увлажните и храните в холодильнике при температуре 2-5°C (36-41°F) в цветочном растворе при рекомендованной производителем норме. При хранении всегда держите стебли Snapdragons вертикально.

Вазостойкость


7-10 дней

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.


Фотографии сорта




Orange



Pink



Rose Improved



White



Yellow



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2026 Ball Horticultural Company